

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Варикоза нет»

Иванова Лилия Эмировна

«04» марта 2026



ИНФОРМАЦИЯ

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Номер	результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	правила, условия сохранения эффективно го и безопасного результата лечения	Гарантийный срок на достигнуты й лечебный результат	Необходим ые действия по истечению гарантийно го срока результата лечения	возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения
1	Микропенная склеротерапия, микросклеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг,	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен

ношение
компрессион
ного белья.

2

**Стволовая скле-
ротерапия**

исключение 6 месяцев
солнечного
загара,
посещения
соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
последней
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья,
прием
флеботонико
в

повторная
процедура
при наличии
показаний
появление новых
варикозно расширенных
вен, увеличение их
количества и размеров,
нарастание явлений
хронической венозной
недостаточности: тяжести
ног в вечернее время и
после рабочего дня, отеки
в вечернее время, кожный
зуд, изменение цвета
кожных покровов,
примечание 1*

3.

ЭВЛК

исключение 12 месяцев
солнечного
загара,
посещения
соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья,
прием
флеботонико
в.
Соблюдение
лечебно-
охранительн
ого режима в
послеоперац
ионном

повторная
процедура
при наличии
показаний
появление новых
варикозно расширенных
вен, увеличение их
количества и размеров,
нарастание явлений
хронической венозной
недостаточности: тяжести
ног в вечернее время и
после рабочего дня, отеки
в вечернее время, кожный
зуд, изменение цвета
кожных покровов,
примечание 2*

4

«Тотал» - ЭВЛК

периоде
Исключение 12 месяцев
посещения
соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья,
прием
флеботонико
в.

Соблюдение
лечебно-
охранительн
ого режима в
послеоперац
ионном
периоде

повторная
процедура
при наличии
показаний

появление новых
варикозно расширенных
вен, увеличение их
количества и размеров,
нарастание явлений
хронической венозной
недостаточности: тяжести
ног в вечернее время и
после рабочего дня, отеки
в вечернее время, кожный
зуд, изменение цвета
кожных покровов,
примечание 2*

5

Минифлеб-
эктомия

Исключение 12 месяцев
посещения
соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья,
прием
флеботонико
в.

Соблюдение
лечебно-
охранительн
ого режима в
послеоперац
ионном
периоде

повторная
процедура
при наличии
показаний

появление новых
варикозно расширенных
вен, увеличение их
количества и размеров,
нарастание явлений
хронической венозной
недостаточности: тяжести
ног в вечернее время и
после рабочего дня, отеки
в вечернее время, кожный
зуд, изменение цвета
кожных покровов,
примечание 2*

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза, летального исхода.